

Superhion®

USO VETERINÁRIO

Ectoparasiticida à base de Fipronil e
Fluazuron para bovinos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Fipronil 1,00 g

Fluazuron 3,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações principais:

Superhion é um ectoparasiticida pour on para bovinos, composto pela associação entre Fipronil e Fluazuron, indicado no controle estratégico de carrapatos e mosca-dos-chifres, e para o tratamento contra bernese e miíases. **Tratamento em dose única.**

Parasitas para os quais o uso de **Superhion** é indicado:

Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus.*

Moscas: Mosca-dos-chifres *Haematobia irritans.*

Bernes: Larvas de *Dermatobia hominis.*

Miíases: Larvas de *Cochliomyia hominivorax.*

Modo de uso e dosagens:

Superhion deve ser administrado pela via tópica (pour on), com aplicação em toda a linha dorsal dos bovinos, do meio do pescoço até a inserção da cauda, na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso

corporal, conforme tabela abaixo:

Intervalo de peso	Dose administrada
De 50 a 149 kg	10 mL
De 150 a 249 kg	20 mL
De 250 a 349 kg	30 mL
De 350 a 449 kg	40 mL
Acima de 450 kg	1 mL/10 kg

Dosagem equivalente a 1 mg de Fipronil e a 3 mg de Fluazuron por kg de peso corporal. O produto não deverá ser administrado em períodos com previsão de chuvas.

Contraindicações e limitações de uso:

Não aplicar em bezerros com idade inferior a 02 meses.

Não utilizar o produto em condições diferentes às indicadas em bula.

O produto não deve ser utilizado em animais que apresentem hipersensibilidade ao Fipronil ou ao Fluazuron.

Nos estudos clínicos realizados com o **Superhion**, o produto se mostrou seguro para o tratamento antiparasitário de bovinos com idade acima de 02 meses.

Precauções:

Não administrar em animais com a pele lesionada.

Não deixar o produto em contato com rações animais ou alimentos armazenados. Ao manipular o produto, utilizar equipamentos de proteção individual (macacão, máscara e luvas).

Evitar longo contato com a pele e a inalação do produto. As mãos deverão ser lavadas após o manuseio do produto.

Se acontecer contato acidental com os olhos e a pele, lavar com água abundante. Em caso de ingestão acidental não induzir o vômito e consultar o médico.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente.

Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 06 meses.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 149 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.113 em 31/07/2015.



Leia o QR code e acesse nosso Áudio Bula.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

CUIDADO  VENENO

Reações adversas:

O produto quando usado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas.

Reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira



 Atendimento
16 3518 2025

 Whats SAC
16 98181 8687
(seg. a sex. das 8h às 17h)



VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

 **ourofino**
saúde animal