

Maxicam 2,0 mg

USO VETERINÁRIO

Anti-inflamatório não esteroide para cães de médio a grande porte.

Fórmula:

Cada comprimido de 200 mg contém:
Meloxicam 2,0 mg
Excipiente q.s.p. 200,0 mg

Indicações:

Maxicam 2,0 mg é um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (COX-2). O bloqueio seletivo da COX-2, proporcionado pelo Meloxicam, confere

um duplo benefício terapêutico, pois resulta em uma excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos degenerativos. **Maxicam 2,0 mg** é indicado como anti-inflamatório e analgésico para cães.

Modo de uso e dosagens:

Administrar o comprimido pela via oral uma vez ao dia (a cada 24 horas), em dosagem de acordo com a tabela abaixo.

Dosagem:

Primeiro dia de tratamento	2 comprimidos para cada 20 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam / kg de peso corporal)
Segundo dia de tratamento em diante	1 comprimido para cada 20 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam / kg de peso corporal)

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro. Nos casos agudos recomenda-se o tratamento por 05 a 07 dias. Nos casos crônicos podem ser necessários tratamentos prolongados por um período máximo de 28 dias ou a critério do médico-veterinário.

Interações medicamentosas:

O uso concomitante com outros anti-inflamatórios não esteroidais e esteroidais (corticosteróides) pode agravar os efeitos colaterais dos AINEs. O uso concomitante com aspirina pode aumentar o risco de toxicidade gastrointestinal. O uso concomitante com anticoagulantes pode aumentar o risco de sangramentos, bem como o uso juntamente com medicamentos que possuem potencial nefrotóxico, como os aminoglicosídeos, pode potencializar o aparecimento de nefrotoxicidade. O uso concomitante com fluconazol pode afetar os níveis plasmáticos de

meloxicam. A digoxina pode aumentar os níveis séricos dos AINEs. Alguns AINEs podem reduzir os efeitos de inibidores da ECA sobre a pressão arterial e reduzir os efeitos de diuréticos. Não administrar em conjunto com diuréticos como furosemida, devido ao risco de redução na síntese renal de prostaglandina.

Contraindicações e limitações de uso:

O produto não deve ser administrado em animais com antecedentes de hipersensibilidade ao Meloxicam. Não administrar em animais com distúrbios cardíacos, hepáticos ou renais severos.

Não administrar em animais com possível ulceração gastrointestinal ou que apresentem evidência de desordem hemorrágica ou hipersensibilidade ao produto. Não administrar em cadelas prenhes no terço final de gestação ou lactação. Não utilizar o produto em intoxicações por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

Precauções:

Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

Obedecer às dosagens e via de administração recomendadas para uso do produto.

Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto.

Descontinuar o tratamento na ocorrência de vômitos, diarreias ou perda do apetite. O uso de Maxicam 2,0 mg não foi avaliado em animais com menos de 12 meses de idade.

Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca do aplicador. Após administrar o produto, lavar as mãos com água e sabão.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Cuidado! Irritante para os olhos quando em forma de pó. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual e transitória podem eventualmente ocorrer, tais como: perda de apetite, vômito, diarreia, sangue oculto nas fezes, apatia e insuficiência renal e em casos mais raros verificou-se diarreia hemorrágica,

hematêmese, ulceração gastrointestinal e aumento das enzimas hepáticas. Os choques anafiláticos em animais devido ao uso do Meloxicam são raros, no entanto, o médico-veterinário deve estar atento à possibilidade de ocorrência. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

Informações para uso médico:

O Meloxicam é um anti-inflamatório não esteroide da família dos oxicams e não possui antídoto específico. No caso de intoxicações, realizar tratamento sintomático.

Advertências:

Seguir as orientações desta bula para utilização do produto.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e administração sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº SP 000005-1.000107 em 01/08/2007.



Leia o QR code e
acesse nosso
Áudio Bula.

KIT 50007184/15

Proprietário e fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria brasileira



PAPEL

50006872/0925 O.F.O



Ouro SAC
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



XXXXX
XXXXXXXXXX
FSC® XXXXXXXX



Enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Acesse reimagina.ourofino.com e conheça nossas iniciativas para garantir o equilíbrio sustentável da saúde animal ao bem-estar do mundo.



ourofino
saúde animal