

Boostin®

USO VETERINÁRIO

Somatotropina bovina recombinante (BST-r) de liberação lenta injetável com vitamina E

Propriedades:

Sabe-se que a somatotropina bovina é liberada na corrente sanguínea, estimulando a formação e secreção de IGF-1 (fator de crescimento semelhante à insulina) pelo fígado. O aumento do consumo de alimento e da produção de leite dependem da quantidade de BST administrada. BST-r estimula a produção de leite das vacas, consequentemente, estas irão consumir mais alimento, que então fornecerá a quantidade extra de energia necessária. Grande parte desta energia será direcionada para maior produção de leite ao invés da manutenção da condição corporal.

Fórmula:

Cada seringa de 2 g contém:
Somatotropina
bovina recombinante 500,0 mg
Excipientes q.s.p. 2 g

Indicações:

Boostin, uma formulação de BST-r, é indicado para aumentar a produção de leite em vacas em lactação.

Posologia e modo de usar:

Administrar em vacas leiteiras no período de lactação, 1 seringa de 2 g (500 mg de BST-r) a cada 14 dias, alternando-se os lados esquerdo e direito a cada aplicação. O melhor período para iniciar a aplicação é imediatamente após o pico de produção leiteira.


Nota:

Deve-se aguardar o produto atingir a temperatura ambiente antes da sua aplicação.


Boostin deve ser administrado conforme

recomendações abaixo:

1. Conter o animal adequadamente.
2. Limpar e desinfetar a área de injeção. O local de injeção recomendado é a fossa ísqueo-retal.
3. Utilizando um aplicador.




Puxar o cilindro para cima pressionando o botão no lado esquerdo e colocar uma seringa de **Boostin** no cilindro.




4. Empurrar o cilindro para baixo até que ele faça um clique.

5. Remover a tampa da agulha da seringa.



6. Inserir a agulha completa pela via subcutânea.

7. Administrar o conteúdo da seringa pressionando a empunhadura até que o êmbolo se trave completamente.



8. Massagear o local após a injeção.

9. Retirar a seringa do aplicador e descartá-la com a agulha tampada.

Duração do tratamento:

Esta formulação de liberação lenta oferece quantidades suficientes de BST-r para aplicação com intervalos de 14 dias, que poderá estender-se até 1 mês antes do período seco.

Contraindicações:

- Animais que não estejam em lactação ou que estejam fora do período de lactação recomendado.
- Animais debilitados, submetidos a um manejo nutricional inadequado ou que apresentem sintomatologia infecciosa da glândula mamária.
- Este produto não deve ser administrado em seres humanos.

Efeitos secundários:

Eventualmente pode ocorrer uma inflamação transitória no local de aplicação.

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Precauções de uso:

- Utilizar somente em animais saudáveis.
- Utilizar somente em vacas em lactação.

- Evitar a exposição do produto a altas temperaturas e raios solares.
- Assegurar manejo e alimentação adequados aos animais para que a resposta ao tratamento seja concretizada.

Conservar sob refrigeração (2°C a 8°C), ao abrigo da luz. Não congelar.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob o número SP 004064-9.000007 em 20/09/1996.

Responsável técnico:

Dr. Marcus Antônio Martins Buso
CRMV/SP 19.533

PRODUTO IMPORTADO

Proprietário e Fabricante:



LG Chem

LG Chem, Ltd.

129, Seogam-ro, Iksan-si, Jeonbuk-do, Korea

Representante exclusivo no Brasil,
importador e distribuidor:

Ourofino S.A.

Rod. Anhanguera SP 330, km 298

CEP: 14140-000 Cravinhos SP

CNPJ: 20.258.278/0001-70

www.ourofino.com



Ouro SAC
16 3518 2025

Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)

 **ourofino**
saúde animal