

NexLaner

USO VETERINÁRIO

Ectoparasiticida à base de Fluralaner para bovinos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Fluralaner 2,50 g
Excipientes q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

NexLaner é um ectoparasiticida *pour on* para bovinos à base de Fluralaner, indicado para tratamento e controle contra carrapatos e mosca-dos-chifres, para tratamento, controle e prevenção contra bernes e para tratamento e prevenção de miiases. **Tratamento em dose única.**

Parasitas para os quais o uso de **NexLaner** é indicado:

Carrapatos: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Moscas: Mosca-dos-chifres *Haematobia irritans*.

Bernes: Larvas de *Dermatobia hominis*.

Miiases: Larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

NexLaner é seguro para utilização em machos reprodutores.

Modo de uso e dosagens:

NexLaner deve ser administrado pela via tópica (*pour on*), com aplicação em toda a linha dorsal dos bovinos, do meio do pescoço até a inserção da cauda, na dose de 1 mL para cada 10 kg de peso corporal, equivalente a 2,5 mg de Fluralaner por kg de peso corporal, conforme tabela abaixo:

Intervalo de peso	Dose administrada
100 kg	10 mL
200 kg	20 mL
300 kg	30 mL
400 kg	40 mL
500 kg	50 mL
Acima de 500 kg	1 mL/10 kg

A aplicação do ectoparasiticida deve ser feita individualmente, com o animal contido de maneira adequada, garantindo a

segurança do animal e do aplicador. As práticas de manejo existentes em cada propriedade, como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, consequentemente, na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Contraindicações e limitações de uso:

Não administrar em pele lesionada.

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos compostos do produto.

Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.

Precauções em humanos:

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consultar um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com roupas, luvas de borracha (luva nitrílica) e máscara adequados. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos e partes expostas do corpo.

Não aplicar sobre pessoas, e alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou

domésticos.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental, procurar socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Produto tóxico para organismos aquáticos. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

Precauções em animais:

Evitar a aplicação em animais debilitados, exaustos ou estressados.

Evitar aplicar o produto em horas de calor intenso ou em dias chuvosos, pois essas condições não foram avaliadas.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. Para estes casos, indica-se o tratamento sintomático.

Interações medicamentosas:

Não são conhecidas interações do fluralaner com outros medicamentos.

Advertências:

Não foram conduzidos estudos de segurança em fêmeas gestantes e lactantes.

Não foram conduzidos estudos de segurança em animais com menos de três meses de idade.

Informações para uso médico:

Grupo químico: Isoxazolinás;

Ingrediente ativo: Fluralaner;

Ação: Inibidor dos canais de cloreto controlados pelo ácido γ -aminobutírico (GABA) (GABA_A) e inibidor dos canais de cloreto dependentes de l-glutamato (GluCl_s) de artrópodes;

Antídoto/Tratamento: Não existe antídoto específico. Se necessário, realizar tratamento sintomático.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 24 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 06 meses, desde que mantido em condições adequadas de armazenamento.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508



Leia o QR Code e acesse
nosso Audio Bula

Licenciado no Ministério da
Agricultura e Pecuária sob o nº
SP 000005-1.000098
em 10/01/2025.



Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140-000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria Brasileira

Ouro SACS
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



ourofino
saúde animal