


Sincromais[®]



USO VETERINÁRIO

Suplemento multimineral para bovinos
Solução Injetável

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Fosfato de sódio monobásico 22,000 g
Glicerosfato de sódio
hexahidratado 15,400 g
Cloreto de Magnésio
hexahidratado 2,750 g
Cobre Quelato 1,170 g
Cloreto de potássio 0,660 g
Selenito de Sódio 0,264 g
Cloreto de Cobalto
hexahidratado 0,100 g
Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Sincromais[®] é uma solução injetável indicada para bovinos, composta por minerais incluindo fósforo, magnésio, cobre, selênio, cobalto e potássio. É destinada à suplementação e no tratamento de estados carenciais relacionadas a estes minerais. O produto é seguro em bezerros e bovinos adultos incluindo, machos reprodutores, vacas gestantes e em lactação quando utilizado de acordo com as recomendações do fabricante.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Modo de uso e dosagens:

O produto **Sincromais[®]** deve ser administrado em dose única, conforme as recomendações abaixo:

Categoria	Volume	Via de Administração
Bezerros	5 mL	Intramuscular ou subcutânea
Bovinos adultos	10 mL	Intramuscular ou subcutânea

Sincromais[®] deve ser administrado utilizando seringa e agulha estéreis e descartáveis. Antes da aplicação, a região deve ser limpa, desinfetada e seca.

Interações medicamentosas:

Não foram identificadas interações medicamentosas relevantes para os minerais presentes quando administrados por via injetável nas doses recomendadas. A administração concomitante com outros medicamentos deve ser avaliada pelo médico veterinário.

seringa com outros medicamentos.

Advertências:

Não foram conduzidos estudos de segurança em bezerros com menos de 60 dias de idade. A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto. Variações de tonalidade podem ocorrer, não representando impacto na qualidade do produto.

Contraindicações e limitações de uso:

O produto não deve ser administrado em animais que apresentem hipersensibilidade aos componentes da formulação. Não misturar em um mesmo frasco ou

Precauções em animais:

Este produto deve ser utilizado sob a orientação do médico-veterinário. Obedecer às dosagens indicadas para o

uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Utilizar agulhas e seringas estéreis e descartáveis e aplicar as boas práticas de assepsia.

Este produto é de uso exclusivamente veterinário.

Evite contato direto com o produto durante o manuseio e aplicação.

Utilize equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados, como luvas descartáveis e, se necessário, óculos de proteção e máscara.

Não aplique o produto em si mesmo ou em outras pessoas.

Em caso de injeção acidental, procure imediatamente atendimento médico, levando a bula e/ou a embalagem do produto para adequada orientação clínica.

Lave cuidadosamente as mãos com água e sabão após o manuseio, mesmo que luvas tenham sido utilizadas.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Pessoas com hipersensibilidade conhecida a algum componente da fórmula devem evitar o contato com o produto.

Em caso de contato acidental com olhos ou pele, lavar imediatamente a região com água corrente por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica se houver sinais de irritação.

Reações adversas:

Não são esperadas reações adversas sistêmicas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual, podem eventualmente ocorrer.

A administração do produto pode, em alguns casos, estar associada a sensações leves a moderadas de desconforto e a presença de um discreto edema no local da aplicação. Essas alterações são geralmente temporárias e tendem a desaparecer espontaneamente.

Em caso de reação persistente, procure imediatamente um médico-veterinário.

Conservar em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar intensa e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após a abertura do frasco, utilizar o produto em

até 06 (seis) meses. Neste período, manter o produto em condições adequadas de armazenamento e esterilidade. Manter o produto dentro da sua embalagem original, protegendo-o da luz, e somente retirá-lo no momento do uso.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

O USO OU APLICAÇÃO DESTES PRODUTOS EM SERES HUMANOS CAUSA GRAVES RISCOS À SAÚDE.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 040/2025 em 02/09/2025.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e acesse
nosso Áudio Bula.

Para mais informações ou em caso de emergência ou exposição, consulte a **Ficha de Dados de Segurança (FDS)**, disponível no **nosso site** ou no **QR Code ao lado**, ou entre em contato com o **nosso Ouro SAC 16 3518 2025**.



SE NECESSÁRIO, PROCURE UM MÉDICO LEVANDO ESTA BULA OU A FDS.

Proprietário e Fabricante:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Estabelecimento nº SP 000005-1
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira



 **Ouro SAC**
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



500694L 0825 0150

 **ourofino**
saúde animal