

Master LP

Uso Veterinario

Reg.: ICA nº 7560 MV

Solución Inyectable

Endectocida de amplio espectro y acción prolongada.

Composición:

Cada 100,00 mL contiene:

Ivermectina 4,00 g

Excipientes c.s.p. 100,00 mL

Indicación:

En bovinos para el tratamiento y control de:

Endoparásitos:

Parásitos gastrointestinales:

Ostertagia ostertagi, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Toxocara vitulorum*.

Parásitos pulmonares:

Dictyocaulus viviparus.

Otros nematodos: *Parafilaria bovicola*, *Thelazia* sp.

Ectoparásitos:

Nuches: *Dermatobia hominis*, *Hypoderma* sp.

Ácaros: *Psoroptes communis* var *bovis*, ayuda en el control de *Sarcoptes scabiei* var *bovis* y

Chorioptes bovis.

Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* y *Solenoptes capillatus*.

Piojos masticadores: Ayuda en el control de *Damalinea bovis*.

Garrapatas: Ayuda en el control de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Miasis: Ayuda en el control de larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

Master LP tiene acción prolongada contra: *Trichostrongylus* sp, *Oesophagostomum* sp, *Dermatobia hominis*, *Ostertagia* sp y *Haemonchus placei*.

Modo de uso y dosificación:

Aplicar por vía subcutánea, 1,0 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme tabla abajo:

Peso (kg)	Dosificación (mL)
50 kg	1,0 mL
100 kg	2,0 mL
200 kg	4,0 mL
300 kg	6,0 mL
400 kg	8,0 mL
500 kg	10,0 mL
1 mL a cada 50 kg	

Dosificación equivalente por kg

de peso corporal: 800 µg de Ivermectina.

Precauciones:

Obedecer a las dosificaciones recomendadas para el uso del producto.

No contaminar corrientes ni depósitos de agua con residuos del producto o sus envases, porque es tóxico para los peces y la vida acuática.

Los residuos del producto y sus envases deben ser dispuestos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

Desechar el remanente del producto luego de transcurridos 06 (seis) meses de la primera toma.

No administrar en hembras gestantes 140 días previo al parto.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar el producto por vía intravenosa.

No utilizar medicamentos con el plazo de validez vencido.

No utilizar en animales que presenten hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

Reacciones adversas:

El producto no presenta reacciones adversas cuando es administrado dentro de las recomendaciones indicadas.

Tiempo de retiro:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 133

días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas en producción de leche destinada al consumo humano.

Condiciones de almacenamiento y conservación:

Conservar el producto en el embalaje original, en lugar seco y fresco, en temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C, y protegido de la luz solar directa y animales domésticos.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS.
VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado por:

Colombia: Reg. ICA 7560-MV -
Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle
4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque
B - Medellín, Colombia - Tel.: (57)
4 366-1429

Manufacturado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil

50003556/0220 OF-00