

Meloxifin Premium 0,5 mg

Uso Veterinario

Antiinflamatorio no esteroide, analgésico y condroprotector a base de Meloxicam y Sulfato de Condroitina A.

Fórmula:

Cada comprimido de 600 mg contiene:
Meloxicam 0,5 mg
Sulfato de Condroitina A 100,0 mg
Excipientes c.s.p. 600,0 mg

Generalidades:

Meloxifin Premium 0,5 mg es una asociación de un antiinflamatorio no esteroide con actividad inhibidora selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), el Meloxicam; con un condroprotector con actividad reparadora de tejidos óseos y cartilaginosa, el Sulfato de Condroitina A.

El bloqueo selectivo de la COX-2 proporcionado por el Meloxicam, confiere un doble beneficio terapéutico, porque resulta en excelente actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexudativa con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de esos efectos, el Meloxicam inhibe también la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos de inflamación degenerativa. El Sulfato de Condroitina A es un importante componente natural del

cartílago articular que estimula la biosíntesis de proteoglicanos y colágeno, restableciendo la integridad fisiológica y funcional del tejido cartilaginoso y del fluido articular y, consecuentemente, la movilidad articular. Una otra función muy importante del Sulfato de Condroitina A es la neutralización de enzimas que son producidas por el cartílago lesionado y que causan la degeneración del tejido cartilaginoso. Contribuye así para el alivio del dolor, reducción del proceso inflamatorio y regeneración del tejido articular.

Indicaciones:

Meloxifin Premium 0,5 mg es indicado como analgésico, antiinflamatorio, antiexudativo y condroprotector para perros y gatos, especialmente en las patologías dolorosas o degenerativas, agudas o crónicas, del aparato osteomioarticular, tales como: osteítis, artritis, artritis reumatoide, osteoartritis, espondilosis, espondiloartrosis anquilosante, displasias coxofemorales, calcificación de discos intervertebrales, reparación de fracturas, postoperatorio de artroplastias y traumatismos.

Modo de uso y dosificación:

Administrar el comprimido en dosificación de acuerdo con la tabla abajo, una vez al día.

Dosificación para Perros:

Primer día de tratamiento	2,0 comprimidos para cada 5 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam y 40 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).
Segundo día de tratamiento en adelante	1,0 comprimido para cada 5 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam y 20 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).

Dosificación para Gatos:

1 comprimido para cada 5 kg de peso corporal
(0,1 mg de Meloxicam por kg de peso corporal y 20 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).

La duración del tratamiento deberá ser estipulada de acuerdo con la gravedad del cuadro clínico y tipo de afección a ser tratada. En afecciones agudas de los perros se recomienda el tratamiento por 05 a 07 días. En las patologías crónicas pueden ser necesarios tratamientos prolongados por un período máximo de 28 días o a criterio del médico veterinario. En gatos, el tratamiento no debe ultrapasar 04 días consecutivos. La presencia del Sulfato de Condroitina A confiere al Meloxicam Premium 0,5 mg la capacidad de reparación de los tejidos cartilaginosos y óseos acometidos de degeneraciones. Recomendamos la continuidad del tratamiento con Sulfato de Condroitina a criterio del médico veterinario.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar en animales con disturbios cardíacos, hepáticos o renales severos. No administrar en animales con posible ulceración gastrointestinal o que presenten evidencia de desórdenes hemorrágicos o hipersensibilidad al producto. No administrar en hembras preñadas o en lactancia. No utilizar el producto en intoxicaciones por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

Precauciones:

Obedecer a la dosificación y vía de administración indicada para el uso del producto. Solamente el médico veterinario puede hacer alteraciones en las dosis del producto. El tratamiento de animales ancianos o con menos de 6 semanas de edad debe ser cuidadosamente acompañado por el médico veterinario, y en algunos casos es necesario reducir la dosis a ser administrada. Descontinuar el tratamiento en la ocurrencia de vómitos, diarreas o pérdida de apetito.

Reacciones adversas:

Pueden ocurrir reacciones generales como disminución del apetito, vómito,

diarrea, melena y apatía. Estas reacciones son generalmente transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o fin del tratamiento.

Interacciones medicamentosas:

No administrar juntamente con otros antiinflamatorios esteroides o no esteroides o tras el uso de esas drogas. No administrar juntamente con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos. No administrar juntamente con agentes anticoagulantes como la warfarina o el ácido acetilsalicílico.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y de las mascotas.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta del médico veterinario.

Las informaciones contenidas en este inserto son soportadas por estudios realizados con el producto y descripciones de literaturas referenciadas abajo: CAULEKETT ET AL., 2003; NARITA, 2006; PLUMB, 2002; SPINOSA, 2005; SPINOSA ET AL., 2008; USP, 2004; WALLACE, 2003.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado y distribuido por:

Colombia: Reg.: ICA N° 9910 - MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429 / **México:** Reg. Q-7750-105 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil

Meloxifin Premium 2,0 mg

Uso Veterinario

Antiinflamatorio no esteroide, analgésico y condroprotector a base de Meloxicam y Sulfato de Condroitina A.

Fórmula:
Cada comprimido de 800 mg contiene:
Meloxicam 2,0 mg
Sulfato de Condroitina A 400,0 mg
Excipientes c.s.p. 800,0 mg

Generalidades:
Meloxifin Premium 2,0 mg es una asociación de un antiinflamatorio no esteroideo con actividad inhibidora selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), el Meloxicam; con un condroprotector con actividad reparadora de tejidos óseos y cartilaginosos, el Sulfato de Condroitina A.

El bloqueo selectivo de la COX-2 proporcionado por el Meloxicam, confiere un doble beneficio terapéutico, porque resulta en excelente actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexudativa con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de esos efectos, el Meloxicam inhibe también la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos de inflamación degenerativa. El Sulfato de Condroitina A es un importante componente natural del cartilago articular que estimula la

biosíntesis de proteoglicanos y colágeno, restableciendo la integridad fisiológica y funcional del tejido cartilaginoso y del fluido articular y, consecuentemente, la movilidad articular. Una otra función muy importante del Sulfato de Condroitina A es la neutralización de enzimas que son producidas por el cartilago lesionado y que causan la degeneración del tejido cartilaginoso. Contribuye así para el alivio del dolor, reducción del proceso inflamatorio y regeneración del tejido articular.

Indicaciones:
Meloxifin Premium 2,0 mg es indicado como analgésico, antiinflamatorio, antiexudativo y condroprotector para perros de tamaños medio a grande, especialmente en las patologías dolorosas o degenerativas, agudas o crónicas, del aparato osteomioarticular, tales como: osteitis, artritis, artritis reumatoide, osteoartritis, espondilosis, espondiloartrosis anquilosante, displasias coxofemorales, calcificación de discos vertebrales, reparación de fracturas, postoperatorio de artroplastias y traumatismos.

Modo de Uso y Dosificación:
Administrar el comprimido en dosis de acuerdo con la tabla abajo, una vez al día.
Dosificación para Perros:

Primer día de tratamiento	2,0 comprimidos para cada 20 kg de peso corporal (0,2 mg de Meloxicam y 40 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).
Segundo día de tratamiento en adelante	1,0 comprimido para cada 20 kg de peso corporal (0,1 mg de Meloxicam y 20 mg de Sulfato de Condroitina A por kg de peso corporal).

OBS: La partición de los comprimidos debe ser realizada solamente al medio, respetándose el sucro presente en los comprimidos.

La duración del tratamiento deberá ser estipulada de acuerdo con la gravedad del cuadro clínico y tipo de afección a ser tratada. En afecciones agudas de los perros se recomienda el tratamiento por 05 a 07 días. En las patologías crónicas pueden ser necesarios tratamientos prolongados por un período máximo de 28 días o a criterio del médico veterinario.

La presencia del Sulfato de Condroitina A confiere al **Meloxicifin Premium 2,0 mg** la capacidad de reparación de los tejidos cartilagosos y óseos acometidos de degeneraciones.

Recomendamos la continuidad del tratamiento con Sulfato de Condroitina a criterio del médico veterinario.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar en animales con trastornos cardíacos, hepáticos o renales severos.

No administrar en animales con posible ulceración gastrointestinal o que presenten evidencia de desórdenes hemorrágicos o hipersensibilidad al producto.

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

No utilizar el producto en intoxicaciones por drogas anticoagulantes (Ex: Cumarina).

Precauciones:

Obedecer a la dosificación y vía de administración indicada para el uso del producto. Solamente el médico veterinario puede hacer alteraciones en las dosis del producto.

El tratamiento de animales ancianos o con menos de 6 semanas de edad debe ser cuidadosamente acompañado por el médico veterinario, y en algunos casos es necesario reducir la dosis a ser administrada.

Descontinuar el tratamiento en la ocurrencia de vómitos, diarreas o pérdida de apetito.

Reacciones adversas:

Pueden ocurrir reacciones generales como disminución del apetito, vómito, diarrea, melena y apatía. Estas

reacciones son generalmente transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o fin del tratamiento.

Interacciones medicamentosas:

No administrar juntamente con otros antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos o tras el uso de esas drogas.

No administrar juntamente con antibióticos del grupo de los aminoglucósidos.

No administrar juntamente con agentes anticoagulantes como la warfarina o el ácido acetilsalicílico.

Consérvelo en un lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar, fuera del alcance de niños y de las mascotas.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta del médico veterinario.

Las informaciones contenidas en este inserto son soportadas por estudios realizados con el producto y descripciones de literaturas referenciadas abajo:

CAULEKET ET AL., 2003; NARITA, 2006; PLUMB, 2002; SPINOSA, 2005; SPINOSA ET AL., 2008; USP, 2004; WALLACE, 2003.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado y distribuido por:

Colombia: Reg.: ICA 9909-MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429 / **México:** Reg. Q-7750-107 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil