

# Sincrogest Inyectable

Uso Veterinario

Progesterona Inyectable

## Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Progesterona ..... 15,00 g

Vehículo c.s.p. .... 100,00 mL

## Indicaciones:

En bovinos (hembras adultas) para el manejo farmacológico de ciclo estral.

## Generalidades:

La Progesterona es una hormona esteroide y determina la duración del ciclo estral por medio del bloqueo de la secreción de la hormona liberadora de las gonadotrofinas (GnRH) en el hipotálamo y consecuentemente de LH y la ovulación.

**Sincrogest Inyectable** posee amplia utilización en medicina veterinaria cuando es necesario reproducir el efecto de progestágenos naturales. Es indicado para hembras bovinas en la sincronización de onda folicular en la utilización en conjunto con estrógenos. Tal

asociación determina la atresia de folículos y emergencia de una nueva onda folicular.

## Modo de uso y dosis:

Para la sincronización de onda folicular en la utilización en conjunto con estrógenos, aplicar **Sincrogest Inyectable** por la vía intramuscular profunda en la dosis de 1,0 mL (150 mg de Progesterona) en dosis única.

## Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No aplicar en animales jóvenes, sexualmente inmaduros. No utilizar el producto con el plazo de caducidad vencido. No utilizar en animales que presenten hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

## Precauciones:

Obedecer al modo de aplicación del producto. Utilizar agujas y jeringas estériles, observando las

buenas prácticas de asepsia. La respuesta a los tratamientos hormonales depende del buen estado corporal (nutricional y de sanidad) en que el animal se encuentra y de la ausencia de disturbios fisiológicos, reproductivos y hormonales.

### **Interacciones medicamentosas:**

El metabolismo de las progestinas, entre ellas la Progesterona, puede aumentar cuando son administradas conjuntamente con la rifampicina, ya que esta última es un potente inductor de las enzimas del citocromo P450 presentes en el hígado.

### **Reacciones adversas:**

El producto no provoca reacciones adversas cuando se utiliza de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. No se esperan reacciones de hipersensibilidad en animales con el uso del producto, sin embargo, pueden ocurrir reacciones individuales de hipersensibilidad en animales susceptibles.

### **Tiempo de Retiro:**

No hay tiempo de retiro para la carne de los animales tratados. No hay tiempo de retiro para la leche de los animales tratados.

**CONSERVAR EL PRODUCTO EN SU EMBALAJE ORIGINAL, ENTRE 15°C Y 30°C, PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.**

**Venta bajo fórmula del médico veterinario.**

### **Responsable Técnica:**

Dra. Caroline Della Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508

### **Importado y distribuido por:**

**Colombia:** Reg.: ICA N°  
10864-MV – Ouro Fino  
Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43  
a 195 Oficina 222 Bloque B –  
Medellín, Colombia – Tel.: (57) 4  
366- 1429 / **Paraguay:** Reg.:  
SENACSA N° 20830 –  
Agroveterinaria Provet de  
Manuel Carvalho Hab. N: 894.  
Direc.Tec.: Dr. Manuel Carvalho.  
Reg.Prof.429.

---

### **Elaborado por:**

Ourofino Saúde Animal Ltda.  
Rod. Anhanguera SP 330, km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
Tel/Fax: 55 16 3518 2025  
[www.ourofinosaudeanimal.com](http://www.ourofinosaudeanimal.com)  
Hecho en Brasil

50005423/0522 OF00