

FRONPet

Uso Veterinario

Ectoparasitocida para perros y gatos

Reg. ICA N° 10265 - MV

Concepto toxicológico N° ERIAP-CT-2017-0343

Solución tópica

Composición:

Cada 100 mL contienen:

Fipronil 12,50 g 12,50% p/v

Excipientes

c.s.p. 100,00 mL 100,00% p/v

Indicaciones:

En perros y gatos para el tratamiento y control de infestaciones causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) y en perros para el tratamiento de infestaciones causadas por garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).

Precauciones y advertencias de su uso y aplicación:

Obedecer al modo de aplicación del producto.

Producto para aplicación en dosis única. No se recomienda el fraccionamiento de **FRONPet**, debiendo ser utilizada la dosis indicada para cada rango de peso. Evite manosear el animal o colocar

collares hasta que el sitio de aplicación del producto esté completamente seco. Evite contacto con los ojos y contacto innecesario con la piel lavándose las manos antes y después de la aplicación. En caso de contacto accidental lavar de forma abundante con agua corriente. No guardar o mantener el producto próximo a los alimentos.

Instrucciones de primeros auxilios:

Si ocurre intoxicación accidental, proceder de la siguiente manera: retirar las ropas contaminadas y lavar las partes del cuerpo afectadas, con agua y jabón. Busque la ayuda de un médico. Si el producto entrar en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante, durante 15 minutos.

Antídoto y tratamiento médico:

No hay. El tratamiento debe ser

sintomático.

En caso de intoxicación del animal, llamar al médico veterinario.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela una copia de este prospecto

Medidas para protección del medio ambiente:

No contaminar ríos u otros cursos de agua.

Almacenamiento y manejo del producto:

No utilizar el producto con plazo de validez expirado.

No fumar y no manipular alimentos durante la aplicación del producto. La exposición directa a la luz solar o a altas temperaturas podrá degradar el producto.

Conservar en lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa.

Condiciones de manejo y disposición de desechos y de envases vacíos:

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS.

RESTOS DE PRODUCTO DEBEN SER ELIMINADOS DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE PARA RESIDUOS PELIGROSOS.


LOS ENVASES VACÍOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN POSCONSUMO.

Modo de uso y dosificación:

FRONPet debe ser aplicado exclusivamente por la vía tópica, de acuerdo a las recomendaciones abajo:


- Asegurarse de que el volumen de la pipeta a ser aplicada es compatible con el peso corporal del animal a ser tratado antes de la aplicación en el sitio indicado.

1. Observe si no hay producto en la salida de la pipeta, batiendo en la parte superior de la pipeta.
2. Doble la parte superior de la pipeta en el sitio indicado.




3. Mantener el animal en posición confortable para facilitar la aplicación. Alejar los pelos del animal con los dedos hasta que la

piel este visible en cada punto dónde el producto será aplicado.



4. Aplique todo el contenido de la pipeta directamente sobre la piel entre la región de la nuca y las escapulas del animal, en varios puntos, evitando que el producto escurra en los pelos del animal.



El periodo medio de acción del **FRONPet** es de 30 días. Sin embargo, el intervalo de aplicaciones ectoparasiticidas son extremadamente variables, visto que dependen de diferentes factores como cuestiones biológicas ligadas al parásito (ciclo de vida), nivel de desafío parasitario del ambiente dónde ellos se encuentran y condiciones climáticas. El control completo de las pulgas y garrapatas depende del tratamiento del animal afectado, de otros animales domésticos presentes en el mismo ambiente y del ambiente en que el animal vive.

La indicación del intervalo de aplicaciones queda a criterio del Médico veterinario, mediante el desafío parasitario enfrentado por el animal a ser tratado.

Se recomienda aguardar 3 días tras la aplicación del producto para bañar los animales tratados.

Dosificación:

FRONPet posee cinco presentaciones diferentes comerciales, siendo una para gatos y cuatro para perros, cada una de las indicada para una faja de peso de los animales a ser tratados de acuerdo a las tablas abajo:

Dosis para Perros

Presentación	Volumen de dosis	Peso del animal
Para perros de pequeño porte	0,67 mL	hasta 10 kg
Para perros de medio porte	1,34 mL	de 10,1 a 20 kg
Para perros de grande porte	2,68 mL 4,02 mL	de 20,1 a 40 kg Perros arriba de 40 kg

Dosis para Gatos

Presentación	Volumen de dosis	Peso del animal
Para gatos	0,32 mL	hasta 8 kg

Precauciones y contraindicaciones especiales del producto:

No utilizar medicamentos con el plazo de validez vencido.

No utilizar en animales que presenten hipersensibilidad al componente del producto, visto que irritaciones transitorias pueden ocurrir, tales como hiperemia, ligero prurito en el sitio de aplicación y vómito.

El producto no debe ser utilizado en perros con menos de 4 semanas de edad y gatos con menos de 12 meses de edad.

No se recomienda la utilización del producto en hembras preñadas y lactantes por no haber estudios que garanticen la seguridad de la aplicación del producto en estas fases fisiológicas.

Reacciones adversas:

El producto no provoca reacciones adversas si es utilizado conforme las recomendaciones del fabricante.

Reacciones de hipersensibilidad son raras. Sin embargo, irritaciones transitorias en el sitio de aplicación pueden ocurrir y animales que demostraren reacciones de sensibilidad al Fipronil no deben ser tratados nuevamente.

Los perros pueden presentar discreta

mancha aceitosa y eventual formación de polvo blanco en el sitio de la aplicación del producto, dicha alteración desaparece en hasta 48 horas tras la aplicación.

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

Responsable técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Venta bajo prescripción del médico veterinario.



Mientras cuidamos de la salud animal, reimaginamos el planeta. Accede reimagina.ourofino.com y conoce nuestras iniciativas para garantizar el equilibrio sostenible de la salud animal y el bienestar del mundo.



Importado y Distribuido por:

Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 a 195
Oficina 222 Bloque B – Medellín, Colombia -
Tel.: (57) 4 366-1429

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil