

Meloxifin 2%

Uso Veterinario

Antiinflamatorio no esteroideo

Composición:

Cada 100 mL de solución inyectable contienen:

Meloxicam 2,0 g

Excipiente c.s.p. 100,0 mL

Generalidades:

Meloxifin 2% es un antiinflamatorio no esteroideo con actividad inhibidora selectiva de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), que confiere un doble beneficio terapéutico, resultando en actividad antiinflamatoria, analgésica y antiexsudativa con mínimos efectos gastrolesivos o ulcerogénicos. Además de esos efectos, el Meloxicam inhibe también la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y previene la destrucción ósea y cartilaginosa que ocurre en los procesos de inflamación degenerativa del sistema locomotor.

Indicaciones:

En bovinos, porcinos y equinos como antiinflamatorio no esteroideo. Meloxifin 2% es

Modo de Uso y Dosis:

Meloxifin 2% debe ser administrado por las vías intramuscular o intravenosa, una vez al día (a cada 24 horas), o a criterio del médico veterinario.

Dosis para bovinos	2,5 mL para cada 100 kg de peso corporal (0,5 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Dosis para cerdos	2,0 mL para cada 100 kg de peso corporal (0,4 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)
Dosis para equinos	3,0 mL para cada 100 kg de peso corporal (0,6 mg de Meloxicam por kg de peso corporal)

Duración del tratamiento:

La duración del tratamiento deberá ser estipulada de acuerdo con la especie animal, gravedad del cuadro clínico y tipo de afección a ser tratada.

Se recomienda hasta dos aplicaciones consecutivas, con intervalo de 24 horas, o a

indicado en procesos inflamatorios tales como:

- Patologías del aparato locomotor y enfermedades musculoesqueléticas, como: miositis, tendinitis, osteitis, artritis, artritis reumatoide, osteoartritis, osteoartritis, sinovitis, distensiones miotendinosas, traumatismos, cojeras, síndrome del navicular, laminitis y auxiliar en la reparación de fracturas.
- Afecciones oculares: uveitis, conjuntivitis, postoperatorios.
- Adyuvante en el tratamiento del dolor ocasionado por desordenes de orden reproductiva como retención de placenta.
- Adyuvante en el tratamiento del dolor ocasionado por metritis.
- Mastitis.
- Analgesia pre y postoperatoria.
- Auxiliar en el tratamiento de infecciones agudas o crónicas (neumonía y diarrea) y condiciones febriles.

criterio del médico veterinario.

Interacciones medicamentosas:

No administrar conjuntamente con otros antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos o tras el uso de esas drogas. Se recomienda un período de 24 horas de intervalo entre un

tratamiento y otro, o de acuerdo con la farmacocinética de la droga anteriormente utilizada. No administrar conjuntamente con agentes anticoagulantes como la warfarina, con ácido acetilsalicílico, ni con medicamentos potencialmente nefrotóxicos como los aminoglucósidos.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar en animales con problemas cardíacos, hepáticos o renales severos. No administrar en animales con posible ulceración gastrointestinal o que presenten evidencia de desórdenes hemorrágicos o hipersensibilidad al producto. Evitar la administración en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos en razón que el riesgo de toxicidad renal ser potencializado. No administrar en terneros menores de 1 semana de edad o en potros menores de 6 semanas de edad. No administrar en yeguas gestantes o lactantes.

Precauciones:

Obedecer la dosis y vías de administración indicadas para el uso del producto utilizando normas de asepsia propias para aplicación parenteral.

El tratamiento de animales ancianos o con menos de 6 semanas de edad debe ser cuidadosamente acompañado por el médico veterinario, siendo en algunos casos, necesario reducir la dosis a ser administrada.

Reacciones adversas:

Pueden ocurrir reacciones generales como disminución del apetito, vómito, diarrea, melena y apatía. Estas reacciones son generalmente transitorias y tienden a desaparecer con la interrupción o fin del tratamiento.

Informaciones para uso médico:

El Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroideo de la familia de los oxicanos y no posee antídoto específico. En caso de intoxicaciones, realizar tratamiento sintomático.

Tiempo de retiro:

BOVINOS: LOS ANIMALES TRATADOS NO DEBEN SER SACRIFICADOS PARA CONSUMO HUMANO HASTA 8 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO. LA LECHE PRODUCIDA DURANTE EL TRATAMIENTO Y 72 HORAS DESPUÉS DE

FINALIZADO EL MISMO NO DEBE DARSE AL CONSUMO HUMANO.

CERDOS: LOS ANIMALES TRATADOS NO DEBEN SER SACRIFICADOS PARA CONSUMO HUMANO HASTA 5 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.

EQUINOS: EL PRODUCTO

NO ES INDICADO PARA EQUINOS CUYA CARNE ES DESTINADA AL CONSUMO HUMANO.

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

La utilización del producto en condiciones diferentes de las indicadas puede causar la presencia de residuos arriba de los límites aprobados, haciendo el alimento de origen animal impropio para el consumo humano.

Conservar el producto en su embalaje original, a una temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz solar intensa, fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consulte al médico veterinario. Su venta requiere receta médica.

Importado y Distribuido por:

Colombia: Reg. ICA 9896-MV - Ouro Fino Colombia S.A.S Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B-Medellín, Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil

