Sincrogest®

Uso Veterinário

Dispositivo Intravaginal de Liberação Lenta de Progesterona

Descrição:
Sincrogest® é um dispositivo intravaginal impregnado com Progesterona utilizado para a regulação do ciclo estral em bovinos, programas de inseminação artificial, programas de superovulação de doadoras e sincronização de receptoras.

Fórmula:
Cada dispositivo contém:
Progesterona ..... 1 g
Excipiente q.s.p. ..... 20 g

Ação:
A Progesterona liberada pelo dispositivo atinge níveis supraluteais (superiores a 1 ng/mL) poucas horas após sua colocação, exercendo um importante efeito sobre a dinâmica folicular e sobre o ciclo estral. Em associação com estrógenos, a Progesterona provoca regressão do folículo dominante e início de uma nova onda folicular. Após a retirada do dispositivo e a consequente queda dos níveis de Progesterona, o bloqueio do eixo hipotálamo-hipofisário é liberado, permitindo o desenvolvimento final do folículo e a ovulação. Vários protocolos, associando a Progesterona a outros hormônios, foram desenvolvidos com diversas finalidades, tais como: sincronização de cios e ovulações para inseminação em tempo fixo, sincronização de receptoras, superovulação programada de doadoras, entre outros.

Indicações:
Controle do ciclo estral em vacas e novilhas (gado de corte e leite).

Modo de uso:
Com o uso do aplicador específico, inserir o dispositivo na vagina do animal, deixando a cauda plástica do produto para fora do vestíbulo vulvar, para sua posterior remoção.
A duração do tratamento deve ser de 7 ou 8 dias ou a critério do médico-veterinário.

Via de Administração: Via intravaginal.

Precauções:
Para a colocação no animal, o operador deverá guardar as boas normas de higiene, conservando a limpeza do material e do animal.
Recomenda-se lavar e desinfetar o aplicador logo após o uso.
Armazenar em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar direta e à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Evitar manipular o produto sem o uso de luvas.

Efeitos colaterais:
Não há efeitos colaterais associados à Progesterona. Ocasionalmente, pode-se perceber sinais de vaginite leve que desaparece espontaneamente após a retirada do produto, não comprometendo a eficácia do tratamento nem a saúde do animal.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 21 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Período de carência:
Não há restrição para o consumo humano de leite de animais tratados com **Sincrogest®**. Os dispositivos devem ser retirados 21 dias antes do abate de animais destinados ao consumo humano.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob número 9234/2006.

Responsável Técnica:
Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

Proprietário e Fabricante: / Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira/Industria Brasileña

Fabricante / Elaborado por:
Laboratórios Grascon do Brasil Ltda.
Rua Emílio de Sousa Docca, 472
Vila Santa Catarina, São Paulo-SP
CNPJ: 03.670.008/0001-53

ourofino saúde animal

Sincrogest®

Uso Veterinário

Dispositivo Intravaginal de Liberação Lenta de Progesterona

Descripción:
Sincrogest® es un dispositivo intravaginal impregnado con Progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en bovinos, programas de inseminación artificial, programas de superovulación de donadoras y sincronización de receptoras.

Composición:
Cada dispositivo contiene:
Progesterona ..... 1 g
Excipiente c.s.p. ..... 20 g

Acción:
La Progesterona que el dispositivo libera llega a niveles supraluteales (superiores a 1 ng/mL) pocas horas después de su colocación, ejerciendo un importante efecto sobre la dinámica folicular y sobre el ciclo estral. En asociación con estrógenos, la Progesterona provoca la regresión del folículo dominante e inicio de una nueva onda folicular. Tras la retirada del dispositivo y la consecuente disminución de los niveles de Progesterona, el bloqueo del eje hipotálamo-hipofisario se libera, permitiendo el desarrollo final del folículo y la ovulación. Se desarrollaron varios protocolos asociando la Progesterona a otras hormonas, con diversas finalidades, tales como: sincronización de celos y ovulaciones para inseminación en tiempo fijo, sincronización de receptoras, superovulación programada de donadoras, entre otras.

Indicaciones:
Control del ciclo estral en vacas y novillas (carne y leche).

Modo de uso:
Con el uso del aplicador específico, inserte el dispositivo en la vagina del animal, dejando la cola plástica del producto hacia afuera del vestíbulo vulvar, para su posterior remoción. La duración del tratamiento debe ser de 7 o 8 días o a critério del médico veterinario.

Vía de Administración: Via intravaginal.

Precauciones:
Para la colocación en el animal, el operador deberá mantener las buenas normas de higiene, conservando la limpieza del material y del animal. Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador después de su uso.
Almacénelo en un lugar seco, fresco, al abrigo de la luz solar directa y a temperatura ambiente (15°C a 30°C). Manténgalo fuera del alcance de los animales domésticos. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Evite trabajar con el producto sin el uso de guantes.

Efectos colaterales:
No hay efectos colaterales asociados a la Progesterona. Ocasionalmente, se pueden notar señales de vaginitis leve que desparecen espontáneamente tras la retirada del producto, sin que comprometa la eficacia del tratamiento ni la salud del animal.

Tiempo de Retiro:
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 0 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. No hay tiempo de retiro para la leche de los animales tratados.

ATENCIÓN: OBEDECER A LOS SIGUIENTES TIEMPOS DE RETIRO

BOVINOS:
CARNE: EL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO SOLAMENTE DEBE SER REALIZADO 21 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN.
EL PRODUCTO NO POSEE TIEMPO DE RETIRO PARA EL CONSUMO DE LA LECHE DE BOVINOS TRATADOS.

LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DIFERENTES DE LAS INDICADAS EN ESTA ETIQUETA-INSERTO PUEDE CAUSAR LA PRESENCIA DE RESIDUOS ARRIBA DE LOS LÍMITES APROBADOS, TORNANDO EL ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL IMPROPIO PARA EL CONSUMO.

Consulte al médico veterinario.
Venta bajo prescripción del médico veterinario.
En Ecuador: Su venta requiere receta médica.
En México: Su venta requiere receta médica cuantificada.
Para uso exclusivo del médico veterinario.
En Perú: Venta bajo receta de prescripción restringida del médico veterinario.

Responsable Técnica: Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

Importado y distribuido por: Bolivia: SENASAG Reg. PUV – N.° 3818/09 - Servi-Insumos Bolivia Import Export SRL. – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia / **Colombia:** Reg. ICA N° 7902-MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B – Medellín, Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429 / **Ecuador:** Reg. 9B2-2-13622- AGROCALIDAD - PRODUCTOS NUTRICIÓN Y SERVICIOS PRONUTROS CIA. LTDA – Gaspar de Escalona N39-29 y Granda Centeno, Quito, Ecuador / **Guatemala:** Reg. BR211-26-12-957 (Fabricante Ouro Fino Saúde Animal Ltda) / Reg BR882-26-06-9605 (Fabricante Laboratórios Grascon do Brasil Ltda) / **México:** Reg. Q-7750-056 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México / **Nicaragua:** Reg. MV-7905 / Panamá: Reg. MV-8672 / **Paraguay:** Reg. SENACSA N° 11.008 - Agroveterinaria Provet de Manuel Carvallo Hab. N: 894. Direc.Tec.: Dr. Manuel Carvallo. Reg.Prof.429 / **Perú:** Reg. SENASA F.16.65.I.0254 - INVERSIONES NORVET S.A.C. – Jr. José De la Torre Ugarte N° 368, Oficina 203, Lince. Lima - Perú. / **Venezuela:** Semillas Magna C.A. – Prados del Este – Caracas, Venezuela- Tel.: (58) 212 976-4140 - RIF: J-30569149-5 - Reg. INSAI2041PI33N072315 – Asesora Técnica: Dra. Judith Santos de Rojas

Proprietário/Propietario:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Indústria Brasileira/Industria Brasileña

Fabricante / Elaborado por:
Laboratórios Grascon do Brasil Ltda.
Rua Emílio de Sousa Docca, 472
Vila Santa Catarina, São Paulo-SP
CNPJ: 03.670.008/0001-53

ourofino
salud animal