Boostin®-P

USO VETERINARIO

Somatotropina bovina recombinante (rBST)
Fórmula de liberación sostenida
Suspensión inyectable

La Somatotropina es una proteína natural producida en la glándula hipófisis del ganado y, como otras proteínas, la BST está compuesta de varios aminoácidos.

Boostin-P tiene una formulación de liberación sostenida de Somatotropina Bovina Recombinante (rBST) para uso en vacas de leche. La formulación ofrece una mayor utilidad con su uso en ciclos de 14 días.

Composición:

Somatotropina Bovina
Recombinante (rBST) ..... 500 mg
Excipientes c.s.p. .....2 g

Dosis y Administración:

Aplicar una jeringa (500 mg) por vía subcutánea alternando el lado de aplicación, cada dos semanas.


Comienzo: alrededor de las nueve semanas postparto, cuando la producción de leche disminuye entre 5-10% después del pico de lactancia.

Finalización: 1 mes antes del periodo seco.


Instrucciones de uso

- Sujete el animal adecuadamente
- Limpie y desinfecte el área de inyección


1. Coloque la jeringa en el inyector.




2. Hale el cilindro hacia arriba presionando el botón en el lado izquierdo del inyector y coloque una jeringa en el cilindro.




3. Empuje hacia abajo el cilindro hasta que el cilindro haga clic.




4. Retire el capuchón de la aguja de la jeringa.



5. El sitio de inyección recomendado es la fosa isquiorrectal o el área subescapular.



6. Inyecte por vía subcutánea insertando toda la aguja.
- Administre el contenido de la jeringa presionando la empuñadura hasta que el pistón se detenga por completo.
- Masajee el sitio después de la inyección.
- Retire la jeringa del inyector y deséchela con la aguja tapada.



Reacciones adversas:

Inflamación local y transitoria alrededor del sitio de inyección.

Precauciones y Contraindicaciones:

- Aplicar únicamente en animales sanos en periodo de lactancia.
- Se recomienda buen manejo y nutrición para una óptima producción láctea.
- Consulte al Médico Veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Tiempo de Retiro: 0 días
Este producto no debe ser aplicado a seres humanos.
En caso de autoinyección accidental, consulte al médico de inmediato.

Almacenamiento:

Consérvese refrigerado (2°C-8°C). Protegido de la luz solar y el calor excesivo. **No congelar**.
Mantener la jeringa a temperatura ambiente (15°C-30°C) antes de su uso.

Advertencias:

La actividad de la Somatotropina Recombinante Bovina ha sido evidente en animales con un buen manejo sanitario y nutricional.
El manejo inadecuado de la producción y el control deficiente de los forrajes puede traducirse en trastornos de la reproducción y en mastitis.
Se recomienda que se realice un seguimiento de la incidencia de mastitis clínica y el uso de antimicrobianos en los hatos donde se suministre el producto.

Consulte a su representante de ventas de Ouro Fino Colombia para un plan de seguimiento adecuado.

Elaborado por:

LG Chem

LG Chem, Ltd.
129, Seogam-ro, Iksan-si, Jeonbuk-do, Korea

Importado en Colombia por:
Ouro Fino Colombia S.A.S.
Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín - Tel.: (57) 4 366-1429
www.ourofino.com
Reg. ICA 11176-BV

LPR500008D-2

BUL - 13000799/1224 OF00

ourofino
salud animal